

Développement limité

Raouf Laroussi

Décembre 2024

1 Premiers pas

Le but de ce nouveau chapitre est d'essayer d'approcher des fonctions à l'aide de polynômes. Pour cette première séance on se préoccupera de l'approximation autour de 0 de quelques fonctions usuelles. On notera $\varepsilon(x)$ des fonctions telles que $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0$.

Exercice

Soit f la fonction définie sur $] - 1/2, 1/2[$ par $f(x) = 1/(1 - x)$.

1. Rappeler la formule pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique de raison x .
2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + x^n \cdot \frac{x}{1-x}.$$

3. Que dire du comportement de la fonction $\frac{x}{1-x}$ en 0 ?

Définition

On dit que f admet un *développement limité à l'ordre n au voisinage de 0* si il existe un polynôme $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ (appelé *partie régulière* du développement limité) tel que :

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + x^n\varepsilon(x).$$

On peut démontrer que si f admet un développement limité, le polynôme de la définition (la partie régulière) est unique. Que dire alors du développement limité de la fonction de l'exercice ???

Exercice

Soient f et g deux fonction admettant un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0.

1. Que dire de $f + g$?
2. Que dire de fg ?
3. Que dire de af , où $a \in \mathbb{R}$?
4. Peut-on déterminer un développement limité de f à l'ordre $k < n$ au voisinage de 0 ?

2 Résultat fondamental

Théoreme : Formule de Taylor

Si f est n fois dérivable au voisinage de 0, alors :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + x^n\varepsilon(x).$$

Exercice

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \sin(x)$.

1. Calculer les dérivées successives de f .
2. Déterminer $f^{(n)}(0)$ pour tout n dans \mathbb{N} .
3. En déduire le développement limité de la fonction sinus en 0 à l'ordre n .

Répéter les questions précédentes avec la fonction $g(x) = e^x$.

Exercice

Déterminer pour tout n les $f^{(n)}(0)$ où f est la fonction de l'exercice ??.

3 Développements limités usuels à connaître

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n\varepsilon(x)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + x^{2p+1}\varepsilon(x)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^p \frac{x^{2p}}{(2p)!} + x^{2p}\varepsilon(x)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + x^n\varepsilon(x)$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots - \frac{x^n}{n} + x^n\varepsilon(x)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \alpha(\alpha-1)\frac{x^2}{2!} + \dots + \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)\frac{x^n}{n!} + x^n\varepsilon(x)$$

4 Règle de calcul - applications

Soit u une fonction telle que $u(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0$ et admettant un développement limité. Si f admet un développement limité en 0, alors, $f \circ u$ admet un développement limité en 0.

Déterminer le développement limité de $\sin(2x^2)$ à l'ordre 5 au voisinage de 0.

Exercice

En effectuant un développement limité, retrouver la valeur de la limite de $\sin(x)/x$ lorsque $x \rightarrow 0$.

Exercice

Déterminer une valeur approchée de $\sin(1)$. Comparer avec ce que donne la calculatrice. Faire de même avec $e = e^1$.

Exercice

Soit f la fonction définie par $f(x) = e^{1/x} \sqrt{x(x+2)}$ pour tout x de \mathbb{R}_+^* . On souhaite étudier le comportement de f au voisinage de $+\infty$.

1. Soit $h = 1/x$. Écrire $f(x)$ en fonction de h .
2. Effectuer le développement limité de $f(h)$ à l'ordre 2 en 0.
3. En déduire l'existence d'une asymptote à la courbe de f en $+\infty$ et déterminer son expression.